

**ISAGRO**  
**LINEA TRAPPOLE**



# OLIVE

TRAPPOLA A FEROMONI SPECIFICA  
PER LA MOSCA DELL'OLIVO  
(*Bactrocera oleae*)



**CON LA TRAPPOLA "OLIVE"  
LA MOSCA NON HA SCAMPO!**



# OLIVE

TRAPPOLA A FEROMONI SPECIFICA  
PER LA MOSCA DELL'OLIVO  
(*Bactrocera oleae*)




**OLIVE** è la trappola a feromoni adesiva specifica per il monitoraggio della Mosca dell'olivo, *Bactrocera (Dacus) oleae*. L'attività cromotropica viene abbinata all'uso degli erogatori di feromone, che amplificano l'effetto rendendo più selettiva la cattura. È caratterizzata da un tettuccio a doppia falda, collato nella parte interna, con l'erogatore di feromone composito posizionato a distanza dal tettuccio per massimizzare la capacità di attrazione e cattura.

## CICLO BIOLOGICO DELL'INSETTO

Le femmine depongono un uovo per drupa inserendolo all'interno. Le olive vengono attaccate quando hanno raggiunto un determinato stadio di sviluppo (0,5-0,8 grammi secondo le cultivar). Le larve penetrano nella polpa scavando una galleria di diametro crescente che si avvicina al nocciolo per ritornare poi verso la superficie dove, in una celletta, avviene l'impupamento. Le mosche in estate sfarfallano dalle olive rompendone l'epidermide. Avvicinandosi il periodo più freddo, in corrispondenza della raccolta, la gran parte delle larve invece esce per impuparsi al suolo; questo si verifica anche nei magazzini dei frantoi. In un anno si susseguono diverse generazioni, da 3 a 6 a seconda del clima e delle annate, potendo variare notevolmente la durata di sviluppo e l'epoca di comparsa dei primi adulti. In primavera il *Dacus* può compiere una prima generazione sulle olive rimaste sugli alberi dall'anno precedente o sull'oleastro mentre gli attacchi più gravi alla produzione si osservano a fine estate e in autunno.

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Installare la trappola tra fine giugno o luglio. Si consiglia l'applicazione di un numero di trappole variante da 1-2 per ettaro, a scopo di monitoraggio, fino a 15-20 per ettaro, come metodo ausiliario di lotta (cattura di massa). In quest'ultimo caso può essere utile installare le trappole anche durante il volo primaverile delle mosche, in marzo-aprile. Le trappole devono essere poste esternamente alla chioma degli olivi, in posizione medio alta e con orientamento a Sud.



**INSERIRE L'EROGATORE  
COMPOSITO  
NELL'APPOSITO SOSTEGNO**