

**ISAGRO**  
**LINEA TRAPPOLE**

**ECODIAN<sup>®</sup> CT**

## **LOTTA ALLE CIDIE DEL CASTAGNO**

Diffusore di feromone per il disorientamento  
sessuale di *Cydia fagiglandana* e *Cydia splendana*

  
**ISAGRO**  
Italian creativity for plant health

## LE CIDIE DEL CASTAGNO



Le Cidie, o tortrici, del castagno (*Cydia fagiglandana* e *Cydia splendana*) sono lepidotteri le cui larve sviluppandosi a carico delle castagne possono determinare ingenti perdite di produzione alla raccolta. I danni causati da *C. fagiglandana* e da *C. splendana* possono superare anche il 50% della produzione.

## CONTROLLO

Il controllo delle Cidie è molto difficile, in quanto i trattamenti insetticidi si rivelano spesso impraticabili, poco efficaci o eccessivamente onerosi. **Non è quindi eccessivo affermare che le tortrici del castagno risultano ad oggi difficilmente contenibili.**



## IL DISORIENTAMENTO SESSUALE

**ECODIAN CT** è un filo bio-degradabile impregnato di feromoni specifici che, rilasciati nell'ambiente per un periodo di 70-80 gg, impediscono l'accoppiamento degli insetti adulti.



## COME SI USA

### • INSTALLAZIONE

Il filo, fornito in bobine di 100 metri, va tagliato in segmenti di circa 6 metri di lunghezza ed agganciato ai rami sulle prime branche in alto, con l'ausilio di ganci in dotazione e di un'asta telescopica non in dotazione. I segmenti verticali vanno installati in maniera la più uniforme possibile, in appezzamenti di almeno un ettaro di ampiezza.



### • DOSE DI APPLICAZIONE

Installare da 600 a 900 metri per ettaro, in funzione della tipologia del castagneto e del grado di attacco del parassita previsto o comunque registrato la stagione precedente.


### • EPOCA DI APPLICAZIONE

Il filo va installato prima dell'inizio dei voli, quindi, di norma, entro i primi 15 giorni di giugno. L'andamento dei voli va monitorato con l'ausilio di trappole ISAGRO di tipo TRAPTEST.



## % FRUTTI BACATI (prove 2017)

### Montella (AV)



### Rocccadaspide (SA)

