

ISAGRO
LINEA TRAPPOLE

TRAPTEST



La linea di ISAGRO per il
monitoraggio degli insetti
del vigneto


ISAGRO
Italian creativity for plant health


TRAPTEST

Per le catture della tignoletta (*Lobesia botrana*), della tignola (*Eupoecilia ambiguella*), della tignola rigata (*Cryptoblabes gridella*), della tortrice della vite (*Sparganothis pilleriana*) e dell'eulia (*Argyrotaenia pulchelliana*).

È lo strumento più diffuso e consigliato per eseguire il monitoraggio dei voli dei Lepidotteri nei vigneti, accessorio essenziale per la lotta guidata, consente all'agricoltore di conoscere quando il reale livello di infestazione supera determinate soglie.

Si consiglia di installare 3 trappole per ettaro. In caso di appezzamenti di dimensioni maggiori di un ettaro, calcolare 3 trappole per il primo ettaro e una trappola per ogni ettaro ulteriore. Sostituire gli erogatori dopo 4-5 settimane.

In caso di contemporaneo monitoraggio di più specie, posizionare le TRAPTEST relative a ciascuna specie a una distanza non inferiore a 30 metri.



Confezione TRAPTEST

3 trappole:
9 fondi collati
9 erogatori di feromone



Lobesia botrana



Eupoecilia ambiguella



Cryptoblabes gridella



Sparganothis pilleriana



Argyrotaenia pulchelliana

ROOF

È la trappola a tettuccio collato per il monitoraggio della cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*) e della cocciniglia farinosa orientale (*Pseudococcus comstocki*) di recente introduzione in Italia.

Si impiega collocando 2-3 trappole per ettaro in primavera, sostituendo gli erogatori dopo 4-5 settimane.



Confezione ROOF

3 trappole:
9 fondi collati
9 erogatori di feromone

